



III° Bollettino Tecnico Varietà FUJI anno 2018 Comitato Tecnico Consorzio MelaPiù

MOMENTO ED EFFICACIA DEL DIRADAMENTO CHIMICO

Il diametro corretto (9-10 mm) per l'esecuzione del diradamento chimico (Benziladenina o Metamitron) è stato raggiunto tra **venerdì 27 e lunedì 30 aprile** nella maggior parte degli impianti.

I trattamenti posizionati in questa 'finestra' hanno fornito **ottimi risultati**; quelli eseguiti **dopo sono stati meno efficaci**.

In quasi tutti i frutteti, ad una settimana dal primo intervento, è stato necessario eseguire una rifinitura con Metamitron.

DIRADAMENTO MANUALE

E' ormai ora di procedere, senza indugio, **con il DIRADAMENTO MANUALE**.

Si consiglia di iniziare entro il **18 maggio il primo 'giro'** nel quale si dovrà eliminare il 60-70% dei frutti totali da staccare; non bisogna avere la presunzione di eliminarli tutti perché ancora troppo nascosti ma è importante intervenire precocemente e velocemente per favorire il ritorno a fiore.

Passati 15 giorni si eseguirà il **secondo e ultimo 'giro' (di rifinitura)** per rimuovere il rimanente 30-40% di mele; si raccomanda di **monitorare i frutti/pianta** almeno nei primi giorni di lavoro, **contando 3-4 piante/giorno** per verificare se il 'carico' corrisponde al proprio sesto di impianto (tabella 1).

Tabella 1. Numero di frutti/pianta in relazione al numero di alberi per ettaro

N° piante/ha	N° frutti/ pianta	N° piante/ha	N° frutti/ pianta
1500	150	3500	70
2000	120	4000	60

2500	90	5000	50
3000	80	6000	40

Sono in ogni caso da **eliminare**:

- **frutti piccoli** anche se singoli;
- **frutti** che si trovano nelle **zone interne della chioma**;
- **“ultimi fiori”** eventualmente risparmiati dal diradamento chimico;
- **frutti che già presentano difetti** (es. frutti rugginosi, deformi, grandinati, ticchiolati)

Riguardo agli impianti giovani si consiglia di rispettare diligentemente le indicazioni riportate in tabella 2

Tabella 2. Numero di frutti/pianta in relazione all'età delle piantine

Anno di impianto	N°frutti/pianta
2017	15-25 (in base a volume chioma e sezione rami)
2016	35-50 (in base a volume chioma e sezione rami)

GESTIONE DELLA CIMA

Al fine di raggiungere velocemente l'**equilibrio vegetativo**, si consiglia di **LASCIARE INTERA LA CIMA**.

Operando in questo modo si favorisce il naturale esaurimento della spinta vegetativa.

Nel caso le cime abbiano raggiunto le reti antigrandine è opportuno piegarle con una curvatura abbastanza 'dolce'.

N.B Nei frutteti con **palificazione insufficiente**, al fine di ridurre rischi di ribaltamento, si consiglia il taglio della cima a metà giugno dal quarto anno in avanti (prima foglia - 2015).

Il "taglio di ritorno" dovrà essere fatto in corrispondenza di un ramo di 2 anni con andamento orizzontale, tranquillo e produttivo.

Si ribadisce che solo in questo caso è conveniente tagliare la cima.

GESTIONE DELLA VIGORIA

Nel caso di **impianti molto vigorosi e “scarichi”** si consiglia di rivolgersi al proprio tecnico di riferimento riguardo alle eventuali strategie da adottare per contenere l'esuberanza delle piante.

BUTTERATURA AMARA e PLARA

Dal **me**se di giugno si suggerisce di iniziare i trattamenti a base di **CALCIO** e di proseguirli fino alla raccolta; l'intervallo tra un trattamento e l'altro deve essere di 10-12 giorni.

Si raccomanda particolare diligenza nell'esecuzione dei trattamenti soprattutto negli impianti un po' scarichi e/o squilibrati; in questi casi, a causa dell'eccessiva pezzatura il rischio d'insorgenza di patologie legate alla carenza di Calcio è maggiore.

Tra tutti i formulati a base di Calcio si **CONSIGLIA esclusivamente il CALCIO CLORURO**.

N.B. Il CALCIO CLORURO deve essere impiegato da solo e con temperature inferiori ai 25 °C (interventi serali ad alto volume).

E' giusto ricordare che **solo una parte del calcio** utile al frutto può essere fornito **con i trattamenti**, mentre la quota rimanente proviene dall'**assorbimento radicale**.

Allo scopo di esaltare l'assorbimento del calcio è indispensabile limitare la presenza, nella soluzione circolante, di ioni che competono con la sua assimilazione durante le prime fasi di sviluppo dei frutticini: occorre quindi EVITARE CONCIMAZIONI con POTASSIO, MAGNESIO ED AZOTO AMMONIACALE nei 60 giorni successivi la fioritura.

ANALISI FOGLIARI

Come ogni anno si è deciso di organizzare un "**giro**" d'analisi fogliari.

Il giorno utile per la raccolta delle foglie NON è ANCORA DEFINITO; le aziende interessate sono pregate di prendere **contatto telefonico** con il proprio Tecnico di riferimento per organizzarsi al meglio.

Sarà **OBBLIGATORIO COMPILARE** in ogni sua parte il modulo **"MODULO DI RICHIESTA ANALISI FOGLIE"** che si trova allegato al presente bollettino.

Laboratorio

Laimburg

Fatturazione

Direttamente al produttore

Modalità di prelevamento:

Le foglie da prelevare (**senza picciolo**) sono quelle che si trovano in posizione centrale nel getto dell'anno.

Per ogni analisi sono necessarie 80 foglie provenienti da 20 piante rappresentative del frutteto; quindi per ciascuno dei 20 alberi si preleveranno 4 foglie provenienti da 2 getti (non campionare succhioni).

Le foglie così raccolte si devono riporre in un sacchetto di carta.

RUGGINOSITA' e MICROLESIONI dell'epidermide

Si ripropongono alcune indicazioni utili a limitare l'insorgenza di questi inconvenienti (per maggiori dettagli vedere Bollettino n. 1):

- ❑ Preferire le formulazioni in **polvere o WG** dei vari principi attivi, almeno fino alla fine di luglio;
- ❑ **Non impiegare fitofarmaci in formulazione EC (emulsione concentrata);**
- ❑ **Non impiegare Dodina - Clorpirifos metile - Metiram - Rame**
- ❑ **Ridurre al minimo indispensabile le miscele liquido-polvere.**

IRRIGAZIONE

Si consiglia di posizionare uno o più **tensiometri** (il numero dipende dall'uniformità di tessitura del terreno).

Questo semplicissimo strumento consente di monitorare costantemente la capacità idrica del terreno, aiuta a definire turni e volumi irrigui e consente di determinare il momento d'inizio irrigazione.

Nel **mese di giugno il Tensiometro** andrebbe mantenuto su valori di **20-30**, a **luglio e agosto tra 10-20**.

E' comunque buona norma incrociare i valori letti nei tensiometri con quelli d'**Evapotraspirazione Potenziale**.

COMPATTAZIONE DEL SUOLO

Il **ristagno idrico** che insiste negli interfilari di diversi frutteti è causato anche dalla **compattazione del terreno**; questa condizione a lungo andare può portare all'**asfissia radicale**.

I sintomi più evidenti sono la colorazione verde pallida delle foglie, la vigoria contenuta, il grado di allegazione ridotto, la maggior sensibilità ai diradanti, la riduzione di calibro ecc.

I suoli maggiormente predisposti al compattamento sono quelli con **alto contenuto di limo**.

Per la parziale o totale soluzione del problema sono disponibili sul mercato **attrezzi chiamati Decompattatori o Arieggiatori**; hanno lame ricurve che agiscono in profondità negli interfilari al fine di arieggiare il terreno nella zona occupata dalle radici.

Le **aziende che si sono dotate di questo attrezzo** stanno risolvendo il problema; i terreni decompattati **drenano più velocemente l'acqua in eccesso** riducendo così gli effetti negativi derivanti dall'asfissia.

Si consiglia alle aziende che soffrono il 'ristagno idrico' di prendere in considerazione l'utilizzo di questi attrezzi.

Sarebbe auspicabile eseguire l'intervento con il terreno 'in tempera'.